

Chaves do guia de Marcel Bon (campo)

(pág.)

1. Chapéu convexo, praticamente sem umbo, ou revestimento lanudo ou eriçado, lembrando *Pholiota* ou *Flammula*..... 2
2. Revestimento feltrado a fibrilotomentoso ou escamuloso (sem relevo) ou subglabro..... 3
 3. Mais ou menos ocráceo, odor terroso nalguns casos, sabor amarelado, cortina ou zona anular no pé..... *Malloocybe* (234)
 3. Bege, pé branco com ápice pruinoso..... *I. flocculosa* (240)
2. Revestimento lanudo, hirsuto ou espetado, subescamuloso, pé geralmente concolor ou revestido como o chapéu..... 4
 4. Odor frutado ou balsâmico, às vezes terroso, carne pode avermelhar..... *Inosperma* (Sect. *Cervicolores*) (234)
 4. Odor banal (fúngico, espermático)..... 5
 5. Pé um pouco tomentoso, sem vestígio anular, acastanhado para a base..... *I. lacera* (238)
 5. Pé com zona anular mais ou menos evidente..... 6
 6. Cor bege pálido, hirsuto..... *I. hystrix* (238)
 6. Cor escura..... *I. lanuginosa* (242)
1. Chapéu cónico ou umbonado, revestimento em geral rimoso ou escamuloso..... 7
 7. Base do pé nitidamente em bolbo, nalguns casos marginado..... 8
 8. Pé sem pruína, ou com pruína só junto ao ápice (1–2 mm)..... 9
 9. Cores ocráceas ou amareladas, odor de mel..... *Inosperma* *I. cookei* (234)
 9. Cores escuras ou acastanhadas..... 10
 10. Bolbo arredondado, esbranquiçado, cor geral acastanhada, odor ácido ou a sardineira..... *I. umbrina* (242)
 10. Bolbo marginado, cor geral castanho ruço, odor banal..... *I. napipes* (242)
 8. Pé com pruína evidente..... 11
 11. Cor pálida esbranquiçada passando a vermelho, depois a cobre..... *I. godeyi* (236)
 11. Cor amarelada a cinzento acastanhado, castanho, etc., chapéu pruinoso ou textura radial (esporos gibosos)..... 12
 12. Pé ruço ou avermelhado, chapéu fortemente rimoso (esporos estrelados)..... *I. asterospora* (242)
 12. Pé mais ou menos rosado pálido ou ocráceo, chapéu velado..... *I. decipiens* (242)
 12. Pé esbranquiçado, lâminas com reflexo acinzentado..... 13
 13. Chapéu com 4–5 cm mais ou menos ocráceo ou de aspecto sujo..... *I. praetervisa* (242)
 13. Chapéu com 2–3 cm, com tons amarelado mais vivos..... *I. mixtilis* (242)
 7. Pé cilíndrico ou clavado, sem bolbo nítido..... 14
 14. Tons lilás ou violeta pelo menos no pé..... *I. geophylla* (240), Sect. *Lilacinae* (238)
 14. Avermelhando ao corte ou fricção..... *I. patouillardii* *Inosperma*, Sect. *Lactiferae* (236)
 14. Imutável (pode acastanhar), ou com carne mais ou menos rósea..... 15
 15. Pé sem pruína, ou com pruína só junto ao ápice (1–2 mm), pode ser flocoso..... 16
 16. Odor frutado ou balsâmico, aromático..... 17
 17. Chapéu com centro esverdeado..... *I. corydalina* (236)
 17. Sem esta característica..... 18
 18. Cor dourado a ruço, odor de pera..... *I. pyriodora* (236)
 18. Cor castanho escuro com véu branco no centro, odor trufado..... *Inosperma* *I. maculata* (234)
 16. Odor banal (fúngico, espermático)..... 19
 19. Centro do chapéu com véu esbranquiçado..... Subsect. *Virgatulinæ* p.p. (238)
 19. Disco sem véu..... 20
 20. Chapéu bicolor (castanho no disco, bege na margem)..... *I. phaeodisca* (238)
 20. Chapéu de cor uniforme..... 21
 21. Textura fibrilo-radiada, cor amarelado palha, lám. reflexo oliváceo, aresta flocosa..... *Pseudosperma* *I. rimosa* (234)
 21. Subglabro cor castanho médio (esporos pequenos)..... *I. glabripes* (238)
 19. Revestimento um pouco em mechas ou lanudo..... 22
 22. Pé castanho (esporos gibosos — esporos lisos e longos: *I. lacera*)..... *I. curvipes* (242)
 22. Pé escuro com base verde mais ou menos eriçada (esporos lisos)..... *I. calamistrata* (234)
15. Pé pruinoso pelo menos no ápice (até ao terço superior)..... 23
 23. Só no ápice (Sect. *Tardae* p.p.)..... 24
 24. Cor branco a bege pálido..... 25
 25. Textura do chapéu escamulosa, pé corado..... *I. lucifuga* (240)
 25. Textura do chapéu aveludada uniforme, pé branco..... *I. flocculosa* (240)
 25. Textura do chapéu sedosa uniforme, centro amarelado..... *I. geophylla* (240)
 24. Cor mais ou menos intensa, textura fibrilo-radiada..... 26
 26. Chapéu raiado de ruço, pé branco ou subconcolor..... *I. fuscidula* (240)
 26. Pé mais ou menos rosado, geralmente com coníferas..... 27
 27. Chapéu carnudo, raiado ou rimoso, carne rosada..... *I. nitidiuscula* (240)
 27. Chapéu ± carnudo, raiado ou subliso, carne rosada no pé e ± amarelada no chapéu..... *I. tarda* (240)
23. Pé pruinoso pelo menos até ao terço basal, ou totalmente..... 28
 28. Esbranquiçado ou ocráceo pálido, com coníferas..... 29
 29. Grande, carnudo, tricolomóide (esporos gibosos)..... *I. fibrosa* (242)
 29. Pequeno ou médio (esporos lisos)..... *I. kuehneri* (240)
 28. Tons de fulvo ou castanho mais carregados (Sect. *Splendentes* p.p.)..... 30
 30. Pé branco ou pálido..... 31
 31. Odor banal, chapéu castanho..... *I. phaeoleuca* (240)
 31. Odor de amêndoa amarga, pé rosado no ápice..... *I. hirtella* (240)
 30. Pé escuro na metade basal..... *I. tenebrosa*
 30. Pé ± concolor, odor banal (chapéu dum belo ruço vivo com escâmulas finas)..... *I. vaccina* (240)