

Chaves de géneros de *Inocybe* s.l.

1. Com pleurocistídeos. *Inocybe* p.p.
1. Sem pleurocistídeos. 2

2. Basidiósporos nodulosos/gibosos, ou alongados (como projécteis). *Inocybe* p.p.
2. Basidiósporos lisos, globosos, elípticos, (sub)amigdaliformes ou subfaseoliformes. . . . 3

3. Ápice do estipe pruinoso, fibriloso, furfuráceo, flocculoso; basidiomas sem mudarem de cor onde raspados, basídios sem necropigmentos. *Pseudosperma*
3. Ápice do estipe liso, ou basidiomas ganhando tons avermelhados ou castanhos onde raspados, ou basídios com necropigmentos. 4

4. Cutícula rimosa, ápice do estipe liso, basídios hialinos e curtos ($Q < 4,0$). . . . *Inosperma*
(grupo *Maculata*)
4. Cutícula tomentosa, lanuda, áspera, ou com covinhas e estipe não liso; basídios com necropigmentos e alongados ($Q > 4,0$). 5

5. Basidioma pequeno de hábito tubarióide/onfalínóide, lâminas mais ou menos distantes, caulocistídeos até à base do estipe. *Tubariomyces*
5. Basidioma grande, lâminas apertadas, caulocistídeos sem irem até à base do estipe. . . . 6

6. Basidiomas rubescentes quando raspados, geralmente com um odor distintivo (peixe, barril de vinho, folhas de gerânio raspadas). *Inosperma* (grupo *Cervicolores*)
6. Basidiomas acastanhados onde raspados ou não, podem ter odor de mel, desagradável, ou outro. *Malloocybe*