

Secções de Courtecuisse & Duhem (C&D) e correspondentes referências das espécies em diversos guias

Secção	Subsecção	Epítetos	alternativo	C&D	Bon	Incafo	E&R	Marc.	Bocc.
—	—	"rorida"	<i>Roridomyces roridus</i>	613	182	439	380	—	—
<i>Aciculae</i>	—	<i>acicula</i>	—	608	182	488	398	II-220	242
<i>Adonidae</i>	—	<i>adonis</i>	<i>Atheniella ad.</i>	605	182	435	400	II-220	242
		<i>adonis coccinea</i>	<i>Mycena coccinea</i>	605	—	—	—	—	—
		<i>flavoalba</i>	<i>Atheniella fla.</i>	606	182	—	400	—	242
		<i>floridula</i>	<i>Atheniella ad.</i>	—	—	—	—	II-220	—
		<i>leptophylla</i>	<i>Atheniella lep.</i>	607	—	435	400	—	242
<i>Amictae</i>	—	<i>amicta</i>	<i>iris</i>	549	182	—	402	II-223	—
<i>Basipedes</i> (incl. <i>Bulbosae</i> <i>Longisetae</i> e <i>Clavulares</i>)	—	<i>aciculata</i>	<i>longiseta</i>	—	—	—	—	II-228	—
		<i>bulbosa</i>	<i>Pseudomycena bul.</i>	546	—	—	404	II-228	—
		<i>clavularis</i>	—	—	—	—	—	II-228	—
		<i>mucor</i>	—	—	—	437	—	—	—
		<i>rhenana</i>	—	547	—	—	—	—	—
		<i>stylobates</i>	—	548	182	437	404	II-228	230
		<i>tenuispinosa</i>	—	—	—	—	—	—	230
<i>Calamophilae</i>	—	<i>belliae</i>	—	557	—	—	384	—	—
<i>Calodontes</i>	<i>Marginatae</i>	<i>lammiensis</i>	<i>Prunulus lam.</i>	600	—	—	—	—	—
		<i>pelianthina</i>	<i>Prunulus pel.</i>	600	180	430 432	378	I-274	240
	<i>Purae</i>	<i>diosma</i>	<i>Prunulus dio.</i>	602	—	—	378	II-224	240
		<i>pearsoniana</i>	<i>Prunulus pea./M. kuehneriana</i>	604	341	—	378	—	—
		<i>pura</i>	<i>Prunulus pur.</i>	601	180	432 430	380	I-275	240
		<i>pura alba</i>	<i>Prunulus pur. alb.</i>	601	—	—	—	I-275	240
		<i>pura lutea</i>	<i>M. luteovariegata</i>	601	—	—	—	—	240
		<i>pura purpurea</i>	<i>Prun. pur. purp./multicol./violacea</i>	601	—	—	—	I-275	—

C&D: nº ilustração; Bon, E&R e Boccardo: página; Incafo: nº descrição (volume II); Marcote: volume, página. Números pequenos: referências onde a espécie vem mencionada com a descrição doutra espécie.

Secção	Subsecção	Epítetos	alternativo	C&D	Bon	Incafo	E&R	Marc.	Bocc.
(Calodontes)	(Puræ)	rosea	Prunulus ros.	603	—	432	378 377	I-276	240
		sororia	—	—	—	—	378	—	—
Cinerellæ	—	cinerella	—	590	—	—	384	—	—
		clavicularis	—	591	—	439	382 384	—	—
		pseudopicta	—	592	—	—	386	—	—
Exornatæ		chlorinosma	—	—	—	—	412	—	—
Filipedes	—	arcangeliana	olivascens/cortiana	556	182	420	412	II-222	232
		filopes	iodolens	553	182	—	410	—	230
		flavescens	—	554	—	—	390	—	232
		metata	iodolens tenella	555	182	—	412	—	232
		rebaudengi	—	—	—	—	—	—	232
		xantholeuca	—	—	—	—	—	—	232
Fragilipedes	—	abramsii	—	—	—	—	410	II-219	—
		aetites	—	572	—	419	408	I-267	234
		albido-rosea	—	—	—	—	—	—	234
		algeriensis	—	575	—	—	414 377	—	—
		ammoniaca	—	573	—	419	—	—	—
		citrinomarginata	—	—	—	—	—	—	236
		fragillima	—	—	—	—	—	—	236
		laevigata	—	576	184	—	—	—	236
		leptocephala	chlorinella	577	—	419	414	I-273	236
		niveipes	—	—	—	—	—	—	234
		pilosella	—	578	—	—	—	—	236
		plumipes	strobilicola	—	—	436	408	—	—
		polygramma	—	579	184	431	404	II-227	236
		polygramma candida	—	579	—	—	—	—	—

C&D: nº ilustração; Bon, E&R e Boccardo: página; Incafo: nº descrição (volume II); Marcote: volume, página. Números pequenos: referências onde a espécie vem mencionada com a descrição doutra espécie.

Secção	Subsecção	Epítetos	alternativo	C&D	Bon	Incafo	E&R	Marc.	Bocc.
(Fragilipedes)		<i>silvae-nigrae</i>	—	582	—	—	414	—	—
		<i>stipata</i>	<i>alcalina p.p.</i>	577	184	—	—	I-281	—
		<i>ustalis</i>	—	574	—	—	—	—	—
		<i>vitis</i>	<i>filipes s.auct.</i>	580	184	—	—	II-229	236
		<i>vividimarginata</i>	—	581	—	—	398	I-281	—
		<i>zephyrus</i>	—	583	184	—	410	—	236
<i>Fuliginellae</i>	—	<i>agrestis</i>	—	—	—	—	382	—	—
		<i>vulgaris</i>	—	593	182	439	382	I-282	240
<i>Hiemales</i>	<i>Hiemales</i>	<i>hiemalis</i>	<i>Phloeomana h.</i>	609	186	—	394	—	242
		<i>olida</i>	<i>Phloeomana minutula</i>	610	186	—	396	—	242
	<i>Omphalariariae</i>	<i>alba</i>	<i>Phloeomana a.</i>	611	—	418 429	384	—	242
		<i>speirea</i>	<i>Phloeomana s.</i>	612	186	—	386 384	—	—
<i>Hygrocyboideae</i>	—	<i>epipterygia</i>	—	584	182	424 438	380	I-270	238
		<i>epipterygia epipterygoides</i>	—	585	—	—	380	—	—
		<i>epipterygia pelliculosa</i>	—	—	—	—	—	—	238
		<i>viscosa</i>	<i>epipterygia viscosa</i>	586	182	438	377 380	—	238
<i>Lactipedes</i> s.l. (incl. <i>Crocatae</i> <i>Galactopoda</i> <i>Sanguinolentae</i>)	—	<i>crocata</i>	—	599	180	423	398	I-268	238
		<i>erubescens</i>	—	594	—	—	394	I-279	—
		<i>galopus</i>	—	595	180	426	408	I-272	238
		<i>galopus amplodesmae</i>	—	—	—	—	408	—	—
		<i>galopus candida</i>	<i>g. alba</i>	595	—	—	408	I-272	—
		<i>haematopus</i>	—	597	180	427 423	388	I-271	238
		<i>leucogala</i>	<i>galopus nigra/leucogala</i>	596	—	426	408	I-272	238
		<i>sanguinolenta</i>	—	598	180	423 427	388	I-279	238
<i>Luculentae</i>	<i>Elegantes</i>	<i>aurantimarginata</i>	<i>elegans</i>	558	180	421	380	—	234
		<i>chlorantha (Filipedes)</i>	—	559	—	—	—	—	—

C&D: nº ilustração; Bon, E&R e Boccardo: página; Incafo: nº descrição (volume II); Marcote: volume, página. Números pequenos: referências onde a espécie vem mencionada com a descrição doutra espécie.

Secção	Subsecção	Epítetos	alternativo	C&D	Bon	Incafo	E&R	Marc.	Bocc.
(<i>Luculentae</i>)	<i>Rosellae</i>	<i>rosella</i>	—	560	—	—	—	—	—
<i>Mycena</i>	—	<i>flos-nivium</i>	—	—	—	—	406	—	—
		<i>galericulata</i>	—	587	184	425 431	404	II-225	232
		<i>inclinata</i>	—	588	184	428	404 398	I-269	22
		<i>maculata</i>	—	589	—	—	—	I-269	232
		<i>tinnabulum</i>	—	—	184	428	386	—	—
<i>Polyadelphia</i>	—	<i>albidula</i>	<i>albida</i>	—	—	—	382	—	—
		<i>capillaris</i>	<i>Pseudomycena cap.</i>	—	—	—	382	—	—
		<i>polyadelphe</i>	—	—	—	—	382	—	—
		<i>quercus-ilicis</i>	—	570	—	—	—	—	—
		<i>riparia</i>	—	571	—	—	—	—	—
		<i>smithiana</i>	—	570	—	—	—	—	—
<i>Pterigenae</i>	—	<i>pterigena</i>	—	561	—	—	—	—	—
<i>Rubromarginatae</i>	—	<i>capillaripes</i>	—	562	180	422	392	—	—
		<i>olivaceomarginata</i>	<i>avenacea</i>	564	—	433	392	—	—
		<i>olivaceomarginata contraria</i>	—	564	—	—	—	—	—
		<i>olivaceomarginata roseofusca</i>	—	565	—	—	—	—	—
		<i>purpureofusca</i>	—	566	180	433	—	—	—
		<i>renatii</i>	<i>flavipes/luteoalcalina</i>	567	—	—	—	I-277	234
		<i>rubromarginata</i>	—	568	—	433	—	—	—
		<i>schildiana</i>	—	—	—	—	390	—	—
		<i>seynesii</i>	—	563	—	—	—	—	—
		<i>seynesii</i>	<i>seynii</i>	569	180	436 433	392	I-280	234
		<i>strobilicola</i>	—	—	—	—	—	I-277	236
		<i>thymicola</i>	—	564	—	—	—	—	—

C&D: nº ilustração; Bon, E&R e Boccardo: página; Incafo: nº descrição (volume II); Marcote: volume, página. Números pequenos: referências onde a espécie vem mencionada com a descrição doutra espécie.

Secção	Subsecção	Epítetos	alternativo	C&D	Bon	Incafo	E&R	Marc.	Bocc.
<i>Sacchariferae</i>	—	<i>adscendens</i>	<i>tenerrima</i>	544	—	—	402	II-221	—
		<i>alphitophora</i>	<i>osmondicola</i>	543	—	—	—	—	—
		<i>corynephora</i>	—	545	—	—	402	—	230
<i>Supinae</i>	—	<i>cupressina</i>	—	—	—	—	396	II-226	—
		<i>juniperina</i>	—	—	—	—	—	II-226	—
		<i>meliigena</i>	<i>corticola</i>	551	—	429 460	394	II-226	230
		<i>pseudocorticola</i>	—	552	186	418 429	396	II-226	230
		<i>supina</i>	—	—	—	418 429	—	—	—
<i>Viscipelles</i>	—	<i>cyanorhiza</i>	—	550	—	—	402	—	—